

Patienter som behandlas med blodförtunnande medel

Trombyl / acetylsalicylsyra räknas ej in i denna grupp och behöver ej utsättas. Omega-3 kapslar kan utsättas en vecka innan undersökningen.

Om man vid undersökningen t.ex behöver ta vävnadsprover eller avlägsna en slemhinnepolyp är blödningsrisken ökad såvida inte detta preparat kan sättas ut före undersökningen. Antal dagar man måste vara utan preparatet varierar beroende på läkemedel.

Vi ber Dig därför att kontakta den läkare som ansvarar för förskrivningen av den blodförtunnande medicinen för att ta ställning till om det i Ditt fall är riskfritt att göra så eller om risken med att tillfälligt utsätta preparatet är för stor.

Generella rekommendationer :

- *Clpidogrel* (Plavix) utsättes 5 dagar före undersökningsdagen och kan återinsättas dagen efter ingreppet

- *Dabigatran* (Pradaxa) och apixaban (Eliquis) utsättes 3 dagar för undersökningen och kan återinsättas 3 dagar efter ingreppet

- *Rivaroxaban* (Xarelto) utsättes 2 dagar före undersökningen och kan återinsättas 2 dagar efter ingreppet

- *Ticagrelol* (Brilique) utsättes 7 dagar före undersökning och återinsättes 2 dagar efter ingreppet

- *Apixaban*(Lixiana) utsättes 2 dagar innan ingreppet/undersökningen

Om inget ingrepp utförs kan i regel blodförtunnande läkemedel insättas omedelbart efter undersökningen

Vänligen kontakta den läkare som ansvarar för förskrivningen av blodförtunnande snarast och rådgör runt detta.